

MIST TPS



MIST-TPS® es una dispersión de nanopartículas minerales de alta calidad, la relación azufre / calcio / magnesio proviene de su fuente de origen. A esta se le adiciona en el tratamiento azufre al 99,9% para enriquecer la fórmula. Recomendado para alcanzar el equilibrio ácido-base del suelo generando leves correcciones de pH. También aporta bases reponiendo calcio y magnesio al complejo de Intercambio lo cual mejorará la estructura y química edáfica. Además aporta calcio, magnesio y azufre para la nutrición de las plantas.

EFFECTOS BENÉFICOS:

1. La rápida asimilación del calcio, el cual mejora el transporte del resto de los nutrientes
2. El MIST TPS es especial para la adecuación de suelos con muchos años de producción, para restitución de los cationes básicos (acidez edáfica). El resultado final es un incremento en la producción y la mejora de las condiciones del suelo y su estructura.

CONTENIDO Y RIQUEZA GARANTIZADA:

Calcio (Ca): 8,8%
Magnesio (Mg): 1,9%
Azufre (S): 3,6%

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

pH: 6,9 a 7,5 (a 20°C)
Densidad: 1,2 a 1,4 g/cc
Reacción e índice: NEUTRO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Procurar un almacenaje entre 35°C y -5°C para preservar la integridad del producto.
- Guardar en lugar fresco y al abrigo de la luz solar directa.
- Evitar la formación de vapores.

VOLUMEN:

Bags in Box de 15 litros.

PACKAGING DE DESPACHO:

La presentación en Bag in Box de 15 litros, permite armar un pallet estándar de 56 unidades (840 litros), fácilmente transportable en camioneta y cuyo rendimiento permitirá cubrir hasta 280 Ha.

APLICACIÓN Y DOSIS:

Cultivos Extensivos:
Pulverización, Fertirriego.
Dosis: 2 a 4 Lts/ha por cada aplicación.

Cultivo	Aplicaciones	Litros / Ha x aplicación	Total Litros / Ha	Momento	
				Tera	Zera
Soja	2	1,5 a 2	3 a 4	Barbecho o Siembra	3-6 hojas
Maíz	2	1,5 a 2	3 a 4	Barbecho o Siembra	4-6 hojas
Trigo	2	1,5 a 2	3 a 4	Barbecho o Siembra	Macollamiento
Cebada	2	1,5 a 2	3 a 4	Barbecho o Siembra	Macollamiento
Girasol	2	1,5 a 2	3 a 4	Barbecho o Siembra	4-6 hojas
Pasturas	2	1,5 a 2	3 a 4	Luego Pastoreo o Corte	Inicio de floración
Arroz	2	1,5 a 2	3 a 4	Barbecho o Siembra	5-8 hojas
Algodón	2	1,5 a 2	3 a 4	Barbecho o Siembra	2-3 hojas

Cultivos Intensivos:

Aplicación por Fertirriego.
Dosis: 2 a 5 Lts/ha por cada aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO:

Retirar la vejiga de la caja y proceder a su homogeneización previo a su uso. El contenido puede presentar una separación de fases, mediante la agitación vigorosa se obtiene la condición óptima de empleo.

Pulverizador: previamente limpiar bien la máquina, preparar la solución mezclando la dosis recomendada con el 50% del volumen de agua a utilizar, este proceso realizarlo con agitación continua. El volumen recomendado de agua entre 80 a 100 litros por hectárea, la presión de pulverización que no supere los 3 bar, manteniéndola en un rango entre 2 y 3 bar. Para mejor aplicación mantener la velocidad de la máquina entre 18 a 20 km/hora. Se recomienda usar pastillas de cono hueco. En el caso de recargas para continuar la actividad no dejar vaciar el tanque, mantener como mínimo 15% de su capacidad para volver hacer la mezcla del producto. Una vez terminada la aplicación se debe enjuagar el producto en la máquina con 200 litros y posteriormente proceder a realizar la limpieza habitual del equipo.

Fertirriego: Se deberá preparar la solución madre mezclando la dosis recomendada con el 50% del volumen de agua a utilizar en el riego. Luego de mezclado, se agrega agitando el volumen total de agua de riego. Nota: se deberá mantener la suspensión con agitación constante (evitar el uso de sopladores de aire). Una vez terminada la aplicación, se deberá lavar el equipo y sistema de conducción con agua limpia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Se advierte que la empresa garantiza el contenido y riquezas declaradas en la etiqueta, sin embargo, en su utilización pueden intervenir factores que escapan a nuestro control como son la preparación de mezclas, la aplicación, la climatología, entre otros. El usuario será responsable de los daños causados al cultivo, al suelo o al aplicador, por inobservancia total o parcial de la información explicada en esta etiqueta. Utilizar sólo en caso de reconocida necesidad, sin sobrepasar las dosis recomendadas. Se recomienda su aplicación bajo asesoramiento técnico agronómico.